

poderá determinar depressão do sistema nervoso central com diminuição acentuada da temperatura corporal, bradicardia sintomática, sudorese, sonolência e coma, especialmente em crianças. Hipertensão pode ser seguida de hipotensão. O tratamento é sintomático.

Pacientes Idosos:

Não há informações relacionando a idade com os efeitos do uso do produto em pacientes idosos. Entretanto nenhum problema geriátrico foi relatado até o momento após o uso de NARIX ADULTO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagens

Reg. MS nº 1.4381.0024

Farm. Resp.: Charles Ricardo Mafra

CRF-MG nº 10.883

Registrado por:

Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Rua Engenheiro Prudente, 121 - CEP: 01550-000

São Paulo/SP - CNPJ: 02.814.497/0001-07

Fabricado por:

Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.

Av. Cel. Armando Rubens Storino, 2750

Pouso Alegre-MG - CEP 37550-000

CNPJ 02.814.497/0002-98

Indústria Brasileira



1301670BU1011 - 185 x 130 - PH 512



GRUPO CIMED

NARIX ADULTO

**cloridrato de nafazolina +
cloreto de sódio +
cloreto de benzalcônio**

Forma Farmacêutica e Apresentação:

Solução nasal: Frasco com 30 mL

USO ADULTO - USO TÓPICO

Composição:

Cada mL de NARIX ADULTO contém:

cloridrato de nafazolina.....0,5 mg
cloreto de sódio.....9 mg
cloreto de benzalcônio.....0,1 mg
Veículo* q.s.p. 1 mL
* água deionizada.

Informações ao paciente:

NARIX ADULTO tem ação de descongestionante nasal. O início da ação se dá dentro de 10 minutos e seu efeito dura até 6 horas. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz. Prazo de validade: o prazo de validade está gravado nas embalagens. Não use remédio com o prazo vencido.

Informar ao médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando. Cada frasco de NARIX ADULTO não deve ser utilizado por mais de uma pessoa, para evitar propagação de infecções.

Não exceder a dose recomendada.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Informar ao médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: queimação local, formigamento, rinorréia, ressecamento

da mucosa nasal e cefaléia. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Não usar NARIX ADULTO em casos de hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.

Deve ser usado com cuidado em pacientes portadores de hipertensão, distúrbios cardiovasculares, diabetes mellitus ou hipertireoidismo.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

NARIX ADULTO deve ser evitado durante a gravidez.

O tratamento não deve exceder a duração de 3-5 dias. Se a obstrução nasal persistir sem melhora, mesmo provisória, o uso deve ser suspenso e a terapêutica reavaliada em consulta médica.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

Informações Técnicas:

Características:

O cloridrato de nafazolina é um vasoconstritor e descongestionante com marcante atividade alfa-adrenérgica, de ação imediata, e de efeito prolongado, usado nos estados de edema e congestão das membranas, como as nasais. A ação descongestionante manifesta-se 5 minutos após a aplicação e o seu efeito persiste por cerca de 6 horas.

Indicações:

Como antisséptico e descongestionante nasal.

Como vasoconstritor, no tratamento da congestão e afecções dos seios paranasais.

Contraindicações:

Hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

Precauções e Advertências:

Não deve ser utilizado ininterruptamente durante longos períodos,

por exemplo, em resfriados crônicos. O uso prolongado pode conduzir à congestão nasal de rebote (nariz obstruído). Deve ser usado com cuidado em pacientes portadores de hipertensão, distúrbios cardiovasculares, diabetes melito ou hipertireoidismo. Usar com cautela em pacientes que apresentem forte reação a agentes simpatomiméticos, evidenciado por sinais de insônia, vertigem, etc. Como medida de precaução, nafazolina não deve ser usada durante a gravidez, devido à sua propriedade vasoconstritora.

Interações Medicamentosas:

Antidepressivos tricíclicos ou maprotilina usados concomitantemente podem potencializar o efeito pressor da nafazolina (se houver absorção).

Interferência em Exames:

Não há relatos até o momento.

Reações Adversas:

A tolerância do organismo ao NARIX ADULTO é muito boa, entretanto, alguns pacientes mais sensíveis podem apresentar reações: Locais: Sensação de ressecamento da mucosa nasal, queimação, espirro, formigamento, rinorréia, perda da sensação olfativa, hipermia reativa.

Sistêmicas: Quando absorvido podem ocorrer palpitações (batimentos cardíacos irregulares), cefaléia, nervosismo, tremor, dificuldade em dormir.

Em casos de uso prolongado pode produzir rinite atrófica.

Em caso de dosagem excessiva pode ocorrer alteração do pulso, hipertensão, sonolência e fraqueza.

Posologia:

Pingar 2 a 4 gotas em cada narina de 4 a 6 vezes ao dia.

Superdosagem:

Em caso de superdosagem ou administração acidental via oral,

