

**Dizeres de Cartucho (frente e laterais)**

**Logo Mantecorp**

**NUJOL<sup>®</sup>**  
petrolato líquido

100% óleo mineral

Uso oral ou tópico

Uso adulto e pediátrico

Conteúdo 120 ml

Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera

Sem cheiro/ Sem gosto

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N°  
199/2006. AFE N° 1.00093-0

Farm. Resp.: Lucia Lago Hammes CRF-RJ 2804

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA

Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira

<sup>®</sup>Marca Registrada

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 –

São Paulo-SP (logo)

atendimento@mantecorp.com

www.mantecorp.com

Lote:

Código de barras

Fab.: mês/ano

Val.: mês/ano

**Dizeres de Cartucho (frente e laterais)**

**Logo Mantecorp**

**NUJOL<sup>®</sup>**  
petrolato líquido

100% óleo mineral

Uso oral ou tópico

Uso adulto e pediátrico

Conteúdo 200 ml

Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera

Sem cheiro/ Sem gosto

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA  
RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.00093-0

Farm. Resp.: Lucia Lago Hammes CRF-RJ 2804

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA  
Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro – RJ  
CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira  
<sup>®</sup>Marca Registrada

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 –  
São Paulo-SP (logo)  
atendimento@mantecorp.com  
www.mantecorp.com

Lote: Código de barras  
Fab.: mês/ano  
Val.: mês/ano

## **Dizeres de Cartucho (verso)**

**NUJOL®**

petrolato líquido

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

### **Indicações**

NUJOL é indicado como laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera.

### **Contra-indicações**

**Deve-se evitar o uso de NUJOL na presença de náuseas, vômitos, dor abdominal, gravidez, dificuldade de deglutição, refluxo gastroesofágico e pacientes acamados. Esse medicamento é contra-indicado para crianças menores de 6 anos.**

### **Advertências**

Laxantes não devem ser utilizados por mais de uma semana, a menos que indicado por um médico. Não administrar NUJOL junto com alimentos ou quando houver presença de hemorragia retal. Se notar alteração repentina dos hábitos intestinais durante duas semanas, consulte um médico antes de fazer uso de laxantes. Desaconselhável após cirurgia anorretal, pois poderá causar prurido anal. A exposição ao sol após a aplicação do produto na pele pode provocar queimaduras. O produto não contém protetor solar e não protege contra os raios solares. Há risco de toxicidade por aspiração.

### **Uso durante a gravidez e lactação**

O uso crônico durante a gravidez pode causar hipoprotrombinemia e doença hemorrágica do recém-nascido. Não deve ser utilizado durante a gravidez e amamentação, exceto sob orientação médica.

### **Interações Medicamentosas**

O uso prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) cálcio, fosfatos e alguns medicamentos administrados por via oral, como anticoagulantes cumarínicos ou indandiônicos, anticoncepcionais e glicosídeos cardíacos.

### **Reações Adversas**

Efeitos metabólicos: redução do nível sérico de betacaroteno.

Efeitos gastrintestinais: dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência anal e prurido anal.

Efeitos respiratórios: o óleo mineral deprime o reflexo da tosse facilitando a aspiração podendo ocorrer pneumonia lipídica, mesmo em indivíduos normais. Os pacientes menores de 6 anos, idosos, debilitados e com disfagia estão mais sujeitos à aspiração de gotículas de óleo que pode levar a pneumonia lipídica.

**Modo de usar**

No tratamento da prisão de ventre, 15 ml (1 colher de sopa) à noite e outra dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 30 ml (2 colheres de sopa) à noite e 15 ml pela manhã.

Crianças maiores de 6 anos: 1-2ml/kg de peso à noite ou pela manhã.

Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.

Atenção: O uso oral de óleo mineral aumenta o risco de desenvolvimento de pneumonia lipoídica. Pacientes com disfagia, desordens neuromusculares que afetam a deglutição e o reflexo do vômito, além de alterações estruturais da faringe e esôfago apresentam risco aumentado de desenvolvimento de pneumonia lipoídica. Esta predisposição é potencializada em neonatos e idosos.

**Composição:** petrolato líquido (óleo mineral).

**Cuidados de conservação:** Nujol deve ser conservado em temperatura entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

NUJ 08F2/mar/08

**Dizeres de Rótulo**

**NUJOL®**

petrolato líquido

100% óleo mineral

120 ml

Uso oral ou tópico

Uso adulto e pediátrico

Conservar em temperatura entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 –  
São Paulo-SP (logo)  
atendimento@mantecorp.com

Mantecorp (logo)

Lote:

Val.: mês/ano

**Dizeres de Rótulo**

**NUJOL®**

petrolato líquido

100% óleo mineral

200 ml

Uso oral ou tópico

Uso adulto e pediátrico

Conservar em temperatura entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

Central de Atendimento 08000117788 - Cx. Postal 18114 - CEP 04626-970 –  
São Paulo-SP (logo)  
atendimento@mantecorp.com

Mantecorp (logo)

Lote:  
Val.: mês/ano