

Malvatricin®

Tirotricina 0,3 mg/ml – Quinosol 10 mg/ml

Anti-séptico da boca e garganta

Indicações: Afecções da boca, aftas e dor de garganta.

Composição: Cada 10 mL contém: Tirotricina 3,00 mg; Quinosol 100,00 mg; Veículo q.s.p. 10,0 mL. Veículos: Ácido Cítrico, Álcool Etílico, Edetato Diidratado Dissódico, Fosfato de Sódio Dibásico, Mentol Cristal, Metilcelulose, Óleo de Mamona 40 OE, Óleo de Menta Trirrefinado, Sacarina Sódica, Tintura de Malva, Corante Azul Brilhante, Corante Amarelo Crepúsculo e Água Deionizada.

Contra-indicações: É contra-indicado em pacientes alérgicos a este medicamento. "Não há contra-indicação relativa a faixas etárias".

Precauções: Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob orientação médica ou odontológica.

Modo de usar: Adultos: Diluir 10 mL (um copinho-medida) de Malvatricin® Solução em meio copo de água. Bochechar e/ou gargarejar, 3 a 4 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções do dentista ou do médico. Nos quadros agudos, usar de 2 em 2 horas. **Crianças:** Molhar uma haste flexível com ponta de algodão no produto diluído e passar nas áreas afetadas da boca. Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso. Não ingerir. Conservar o frasco bem fechado em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz solar. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou odontológica.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Este produto possui álcool em sua composição.

MS. 1.0143.0024.022-3

Farm. Resp.: Alberto R. V. Stein - CRF-RJ 3257

Laboratório Daudt Oliveira Ltda.

Rua Simões da Mota, 57 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.026.055/0001-20 - **Indústria Brasileira**

