

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

Gel estéril para uso oftálmico apresentado em tubo de 10 g.

USO PEDIÁTRICO E ADULTO**COMPOSIÇÃO**

Cada grama de produto contém: 0,10 mg de cetrimida, 2,00 mg de ácido poliacrílico (carbomer; peso molecular aproximado de 4 milhões), 40,00 mg de sorbitol, 0,10 mg de edetato disódio, 0,84 mg de hidróxido de sódio e 956,96 mg de água purificada.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

O produto deve ser conservado em temperatura ambiente (15 - 30°C).

O prazo de validade está indicado no cartucho. Não use medicamentos com o prazo de validade vencido. Descarte o conteúdo restante um mês após aberto.

Vidisic® Gel pode ser administrado em forma de gotas, ou seja, sua aplicação é fácil e cômoda. Ao aplicar o produto, segure o tubo na posição vertical, de forma que uma pequena gota se forme e se desprenda facilmente do gotejador.

Devido a sua alta viscosidade, Vidisic® Gel também é particularmente indicado para o tratamento dos sintomas mais agudos de olho ressecado.

O produto forma uma película protetora de considerável aderência e duração, mantendo a córnea e a conjuntiva umedificadas por um período prolongado. Assim, nos casos mais graves, poucas aplicações (uma média de quatro ou cinco por dia) são suficientes para proporcionar alívio e trazer melhora ao quadro clínico.

Vidisic® Gel é muito bem tolerado, possui ação refrescante, suavizante e, caso necessário, pode ser aplicado frequentemente.

INFORME AO MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ DURANTE O TRATAMENTO.**SIGA RIGOROSAMENTE A POSOLOGIA E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO ESTABELECIDAS PELO SEU MÉDICO.****NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.****INFORME SEU MÉDICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.****TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.****NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU MÉDICO. ISSO PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.****INFORMAÇÃO TÉCNICA**

O produto é apresentado como um gel viscoso e claro e pode ser administrado na forma de gotas, com facilidade e conforto. Ao aplicar o produto, segure o tubo de cabeça para baixo e pressione-o, deixando cair uma gota. Devido à alta viscosidade, o produto é particularmente apropriado para o tratamento de sintomas graves de olhos secos. Uma película protetora é formada, protegendo a córnea e a conjuntiva por um longo tempo. A estabilidade da película lacrimal é mantida por um período de aproximadamente seis horas. Em casos graves, aplicações relativamente pequenas (quatro a cinco gotas por dia) são suficientes para produzir uma melhora adequada. O produto é muito bem tolerado e possui efeito refrescante. Vidisic® Gel pode ser usado com maior frequência de forma segura e sem inconvenientes.

INDICAÇÕES

Substituto do fluido lacrimal na deficiência de produção de lágrimas (olhos ressecados).

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade à cetrimida ou a algum dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Os usuários de lentes de contato não devem utilizar o produto enquanto estiverem portando as lentes.





USO CONCOMITANTE DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS

Em caso de algum tratamento ocular adicional local, deve haver um intervalo de aplicação de, no mínimo, 5 minutos entre as medicações. Deve ser sempre a última medicação a ser instilada.

REAÇÕES ADVERSAS

Mesmo quando administrado conforme a - indicação, este produto pode causar turvação transitória da visão. Os pacientes devem ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas.

POSOLOGIA

Salvo prescrição contrária, de acordo com a gravidade e a manifestação dos sintomas, aplicar uma gota no saco conjuntival de três a cinco vezes ao dia ou com maior frequência e antes de dormir. Não utilizar Vidisic® Gel enquanto estiver usando lentes de contato.

Pacientes idosos: A eficácia e a tolerância em pacientes idosos foram similares àquelas observadas em adultos, indicando não haver necessidade de se alterar a dose ou via de administração.

SUPERDOSAGEM

Os testes toxicológicos sugerem que nenhum outro efeito, senão o efeito terapêutico pretendido, foi observado com doses mais altas. Se ocorrer uma superdosagem, ela deve ser controlada sintomaticamente.

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É UM MEDICAMENTO NOVO E, EMBORA AS PESQUISAS TENHAM MOSTRADO EFICÁCIA E SEGURANÇA QUANDO CORRETAMENTE INDICADO, REAÇÕES ADVERSAS IMPREVISÍVEIS AINDA NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS PODEM OCORRER. EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSAS, O MÉDICO RESPONSÁVEL DEVERÁ SER NOTIFICADO.

Lote, data de fabricação e validade:vide cartucho.

Fabricado por:
Dr. Gerhard Mann,
Chem. Pharm. Fabrik GmbH
13581 - Berlim - Alemanha

Importado e Distribuído por:
BL Indústria Ótica Ltda.
R. Dona Alzira, 139
Porto Alegre - RS - CEP: 91110-010
CNPJ: 27.011.022/0001-03

Reg. MS nº 1.1961.0004.001-9
Resp. Téc.: Ana Paula Ganzer
CRF-RS: 9663

0800	702-6464
www	bausch.com.br

