

**MEDICAMENTO FITOTERÁPICO****PARTE UTILIZADA**

Raiz.

**NOMENCLATURA POPULAR**

Gerânio rosado.

**APRESENTAÇÃO**

Xarope - Tintura da raiz de *Pelargonium sidoides* 307,39 mg - Frasco com 120 mL. Acompanha copo dosador.

**VIA ORAL****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO:**

Cada mL contém:

tintura de *Pelargonium sidoides*.....307,39 mg\*;  
veículos.....q.s.p. 1 mL.

(xarope de sacarose, água deionizada, aroma de laranja e sorbato de potássio)

\*equivalente a 6 µg de umckalina.

O xarope contém 0,3% de álcool.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****POR QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Imunoflan® é indicado para o tratamento de infecções agudas e crônicas do trato respiratório e ouvido, infecções de nariz e garganta como rinfaringites, amigdalites, sinusites e bronquites.

**COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Imunoflan® possui atividade antimicrobiana e de modulação do sistema de defesa.

**QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Pacientes com tendência a sangramentos, doenças renais e hepáticas.
- Pacientes com diabetes.

- Hipersensibilidade (alergia) a qualquer um dos componentes da fórmula.

**Não há contraindicação relativa a faixas etárias.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.**

**Este medicamento é contraindicado para uso por lactantes (mulheres amamentando).**

## **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Precauções e advertências**

- **Atenção diabéticos: Este medicamento contém açúcar.**
- Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.

### **Interações medicamentosas**

- Não utilizar com anticoagulantes, anti-inflamatórios não-esteroidais (como o ácido acetilsalicílico) e medicamentos inibidores da agregação plaquetária.

**Informe seu médico da ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.**

**Informe seu médico se está amamentando.**

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

## **ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Cuidados de conservação**

Imunoflan® deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) em sua embalagem original. Manter o frasco bem fechado.

Proteger da luz e da umidade.

### **Prazo de validade**

24 meses após a data de fabricação impressa no cartucho.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

## **Características físicas**

Forma líquida de cor castanha avermelhada.

## **Características organolépticas**

Cheiro (odor) aromático com notas de laranja e sabor adocicado com notas de laranja.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **Modo de usar**

Agitar o produto antes de usar.

### **Posologia**

Adultos e crianças maiores de 12 anos: ingerir 7,5 mL, o equivalente a  $\frac{3}{4}$  do copo dosador, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Crianças entre 6 e 12 anos: ingerir 5 mL, o equivalente a  $\frac{1}{2}$  copo dosador, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Crianças entre 2 e 6 anos: ingerir 2,5 mL, o equivalente a  $\frac{1}{4}$  do copo dosador, via oral, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas.

Crianças menores de 2 anos: ingerir 2,5 mL, o equivalente a  $\frac{1}{4}$  do copo dosador, via oral, 1 vez ao dia.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retomar a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **QUE MALES ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?**

### **Reações adversas**

Raramente pode ocorrer manchas vermelhas na pele, falta de ar, espasmos intestinais, falta de apetite, vômitos e inquietude.

**Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico do aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

**Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis ou desconhecidas. Nesse caso, informe seu médico.**

### **O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem relacionada à ingestão de *Pelargonium sidoides*.

Recomenda-se tratamento sintomático e controle das funções vitais.

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

**Venda sob prescrição médica.**

MS: 1.1860.0089

Farmacêutica resp.:  
Gislaine B. Gutierrez  
CRF-PR nº 12423

Fabricado e Distribuído por:  
**HERBARIUM LABORATÓRIO  
BOTÂNICO LTDA.**  
Av. Santos Dumont, 1100 • Colombo - PR  
CNPJ 78.950.011/0001-20  
**Indústria Brasileira.**

