



**Baclofen**<sup>®</sup>  
Comprimido 10mg

---

## MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES AO PACIENTE



# Baclofen<sup>®</sup>

baclofeno

### MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA

---

#### APRESENTAÇÃO

##### Comprimido 10mg

Embalagem contendo 20 comprimidos.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO

#### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

baclofeno.....10mg

Excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: amido, celulose microcristalina, lactose monoidratada, dióxido de silício e estearato de magnésio.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Baclofen<sup>®</sup> é usado para reduzir e aliviar a rigidez excessiva e/ou espasmos nos músculos que podem ocorrer em várias condições tais como a esclerose múltipla, doenças ou lesões na medula óssea, e certas doenças cerebrais.

##### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Baclofen<sup>®</sup> é um dos medicamentos do grupo dos relaxantes musculares.

Devido ao relaxamento do músculo e consequente alívio da dor, Baclofen<sup>®</sup> melhora sua habilidade de se movimentar, torna mais fácil o gerenciamento das suas atividades diárias e facilita a fisioterapia.

Se você tiver alguma dúvida sobre como Baclofen<sup>®</sup> funciona ou porque este medicamento foi indicado a você, converse com o seu médico.

##### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

###### Não use Baclofen<sup>®</sup>:

Se você é alérgico (hipersensível) ao medicamento ou aos demais componentes da formulação listados no início da bula.

Se este é o seu caso, informe ao seu médico antes de tomar Baclofen<sup>®</sup>.

Se você acha que pode ser alérgico, converse com o seu médico.

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Siga todas as instruções do seu médico cuidadosamente. Elas podem diferir da informação geral contida nesta bula.

##### **Tenha especial cuidado com Baclofen®:**

-Se você tem doença de *Parkinson* ou alguma doença mental acompanhada por confusão ou depressão;

-Se você for portador de epilepsia (convulsões);

-Se você tem dor aguda no estômago (úlceras) ou no intestino; problemas respiratórios; doença no fígado; ou um distúrbio de circulação sanguínea no cérebro;

-Se você tem doença renal. Seu médico irá decidir se Baclofen® é o tratamento adequado para você;

-Antes de tomar Baclofen®, informe ao seu médico se você estiver tomando medicamentos para artrite ou dor (vide “Ingestão concomitante com outras substâncias”);

-Se você tem dificuldade em urinar;

-Se você é diabético.

Se qualquer uma dessas condições se aplicar a você, informe ao seu médico antes de tomar Baclofen®.

##### **Outras medidas de segurança**

Antes de realizar qualquer tipo de cirurgia (incluindo no dentista), ou de emergência, diga ao médico responsável que você está tomando Baclofen®.

Se for portador de qualquer outra doença informe ao seu médico.

##### **Pacientes idosos (65 anos ou mais) ou pacientes que tenham espasmos musculares causados por uma doença cerebral**

Se você pertence a um desses grupos, você pode apresentar mais efeitos colaterais. Portanto, seu médico irá monitorá-lo apropriadamente e poderá adaptar a dose de Baclofen® que você toma.

##### **Dirigir veículos e operar máquinas**

Em algumas pessoas Baclofen® pode ser associado com tonturas, sonolência ou perturbação visual. Se isso acontecer com você, não dirija veículos, não opere máquinas, ou realize outras atividades que exijam sua atenção.

##### **Gravidez e amamentação**

Pergunte ao seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. Você não deve usar Baclofen® se estiver grávida a menos que seu médico aconselhe você a tomá-lo. Avise ao seu médico se você está grávida ou planeja engravidar. Seu médico discutirá com você o potencial risco de tomar Baclofen® durante a gravidez. Se você tiver que tomar Baclofen® durante a gravidez seu bebê pode ter convulsões logo após o parto.

Apenas uma pequena quantidade de baclofeno pode passar para o leite materno. Contudo que seu bebê seja monitorado e seu médico concorde com o uso deste medicamento, você pode amamentar.

##### **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

##### **Ingestão concomitante com outras substâncias**

Substâncias conhecidas que interferem na ação do Baclofen®:

-Álcool;

-Medicamentos sedativos;

- Medicamentos utilizados para tratar distúrbios do humor, como antidepressivos e lítio;
- Medicamentos utilizados para tratar pressão sanguínea alta;
- Medicamentos utilizados para tratar doença de *Parkinson*;
- Medicamentos para artrite ou dor.

Informe ao seu médico ou farmacêutico se você está usando ou usou recentemente qualquer outro medicamento, incluindo medicamentos obtidos sem prescrição médica.

**Tomando Baclofen<sup>®</sup> com alimentos e bebidas**

Tome Baclofen<sup>®</sup> durante as refeições e faça a ingestão dos comprimidos com um pouco de líquido.

Pacientes em tratamento com Baclofen<sup>®</sup> não devem ingerir bebidas alcoólicas.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use este medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

**5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

DURANTE O CONSUMO ESTE PRODUTO DEVE SER MANTIDO NO CARTUCHO DE CARTOLINA, CONSERVADO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Características do produto:** comprimido circular de cor branca.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

**6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Siga corretamente as instruções de seu médico. Não exceda a dose recomendada.

Tomar Baclofen<sup>®</sup> no mesmo período do dia, isto vai ajudar você a lembrar quando tomar o seu medicamento.

Certifique-se de tomar este medicamento regularmente e exatamente como o seu médico orientou. Isto irá ajudá-lo a obter os melhores resultados e reduzir o risco de reações adversas.

Se você está sendo tratado por 6 a 8 semanas e você não sente nenhuma melhora, informe ao seu médico. O seu médico irá decidir se você deve continuar com Baclofen<sup>®</sup>.

Se você tiver dúvidas sobre quanto tempo deve tomar Baclofen<sup>®</sup>, fale com o seu médico ou farmacêutico.

**Método de administração**

Baclofen<sup>®</sup> deve ser tomado por via oral durante as refeições com um pouco de líquido.

**Posologia**

O tratamento com Baclofen<sup>®</sup> deve sempre ser iniciado com baixas doses que são gradualmente elevadas até que se atinja a dose diária ótima. É recomendada a menor dose compatível com uma resposta ótima. Esta dose deve ser individualizada, de modo que clonos, espasmos flexores e extensores e a espasticidade sejam reduzidos, mas que efeitos

adversos sejam evitados o quanto for possível. De modo a prevenir excessiva fraqueza muscular e quedas, Baclofen® deve ser usado com cautela quando espasticidade é necessária para sustentar a postura vertical e balanço na locomoção ou sempre que espasticidade é utilizada para manter funções. Pode ser importante manter certo grau de tônus muscular e permitir espasmos ocasionais para suporte da função circulatória.

Se nenhum benefício for evidente dentro de 6 a 8 semanas da obtenção da dose máxima, deve ser decidido pelo médico se o tratamento com Baclofen® será continuado.

A descontinuação do tratamento deve ser sempre gradual reduzindo sucessivamente as doses durante aproximadamente 1 a 2 semanas, exceto em emergências em que foi relatada superdose ou em casos que reações adversas sérias tenham ocorrido.

#### **Adultos**

O tratamento deve ser iniciado com dose de 15mg ao dia, preferencialmente dividida em 2 a 4 doses. A dose deve ser aumentada cautelosamente por incrementos de 15mg/dia, a intervalos de três dias, em 15mg/dia três vezes ao dia até que a dose diária necessária seja atingida. Em certos pacientes sensíveis ao medicamento, é aconselhável iniciar com dose diária mais baixa (5 ou 10mg) e elevá-la de maneira mais gradual (vide “O que devo saber antes de usar este medicamento”). A dose ótima geralmente varia entre 30 e 80 mg/dia, embora em pacientes hospitalizados doses diárias entre 100 a 120mg podem, cuidadosamente, ser administradas.

#### **Insuficiência hepática**

Não foram realizados estudos em pacientes com insuficiência hepática em tratamento com Baclofen®. O fígado não desempenha um papel significativo no metabolismo do baclofeno após a administração oral do baclofeno. No entanto, baclofeno tem o potencial de elevar as enzimas hepáticas. Este medicamento deve ser prescrito com precaução em pacientes com insuficiência hepática.

#### **Pacientes idosos (65 anos ou mais)**

Uma vez que a ocorrência de reações adversas é mais provável em pacientes idosos, recomenda-se nestes casos uma programação cuidadosa das doses e manutenção de vigilância apropriada.

#### **Pacientes com estados espásticos de origem cerebral**

Uma vez que a ocorrência de reações adversas é mais provável em pacientes com estados espásticos de origem cerebral, recomenda-se nestes casos uma programação cuidadosa das doses e manutenção de vigilância apropriada.

#### **Se você parar de tomar Baclofen®**

Não interrompa o tratamento repentinamente sem antes verificar com o seu médico. Ele dirá quando e como você pode parar o tratamento. Interromper repentinamente o tratamento pode piorar o seu quadro de saúde.

Se você parar repentinamente o tratamento, poderá apresentar: nervosismo, confusão, alucinações, pensamentos ou comportamentos anormais, convulsões, espasmos incontroláveis, espasmos musculares involuntários ou câimbras, batimento cardíaco acelerado, temperatura corporal elevada. A rigidez excessiva (espasmos) nos seus músculos também pode se agravar.

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você se esqueceu de tomar uma dose prevista, tome-a assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da dose seguinte, não tome a dose perdida ao mesmo tempo que a dose prevista, caso contrário, você estará dobrando a dose. Apenas volte ao seu horário regular de dosagem. Se você se esqueceu de tomar várias doses, você deve consultar o seu médico.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Como todos os medicamentos, Baclofen<sup>®</sup> pode causar efeitos adversos, embora nem todos os pacientes apresentem.

Estes efeitos são frequentemente leves, geralmente ocorrem no início do tratamento e normalmente desaparecem depois de alguns dias.

### **Algumas reações adversas podem ser graves**

- Problemas respiratórios;
- Sensação de confusão;
- Sensação de felicidade extrema;
- Tristeza (depressão);
- Perda de coordenação, afetando o equilíbrio e caminhada, membros e movimentos oculares e/ou da fala (sinais de ataxia);
- Tremores;
- Alucinações;
- Pesadelos;
- Visão turva/distúrbios visuais;
- Falta de ar em repouso ou no exercício, inchaço nas pernas e cansaço (sinais de diminuição do débito cardíaco);
- Pressão sanguínea baixa (hipotensão);
- Erupção cutânea e urticária;
- Dificuldade em urinar, dor ao urinar ou uma diminuição brusca de urina;
- Convulsões;
- Dor abdominal, amarelamento da pele ou olhos e cansaço (sinais de distúrbios do fígado);
- Temperatura corporal baixa;
- Batimento cardíaco lento;
- Sintomas após a descontinuação abrupta do medicamento (síndrome de abstinência) (vide “Como devo usar este medicamento - Se você parar de tomar Baclofen<sup>®</sup>”).

Se você tiver algum destes sintomas, **informe ao seu médico imediatamente.**

**Algumas reações adversas são muito comuns (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento).**

- Torpor;
- Sonolência;
- Náuseas.

Se alguma destas reações te afetar gravemente, **informe ao seu médico.**

**Algumas reações adversas são comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Cansaço;

- Tontura;
- Dor de cabeça;
- Insônia;
- Fraqueza nos braços e pernas;
- Dor nos músculos;
- Movimento incontrolável dos olhos;
- Boca seca;
- Distúrbios do trato digestivo;
- Vômito seco;
- Vômitos;
- Constipação;
- Diarreia;
- Suor excessivo;
- Urina excessiva;
- Enurese noturna.

Se alguma destas reações te afetar gravemente, **informe ao seu médico.**

**Algumas reações adversas são raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- Dormência nas mãos e/ou pés;
- Dificuldade na fala;
- Alterações no paladar;
- Dor abdominal;
- Diminuição repentina na quantidade de urina;
- Inabilidade para obter ou manter uma ereção (impotência sexual).

**Também reportada (frequência desconhecida)**

- Aumento do açúcar no sangue.

Se algum destes efeitos te afetar gravemente, **informe ao seu médico.**

Se você observar quaisquer reações adversas não mencionadas nesta bula, informe ao seu médico ou farmacêutico.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Se você acidentalmente tomou muitos mais comprimidos do que o seu médico prescreveu, fale com o seu médico imediatamente. Você pode necessitar de assistência médica.

Os principais sintomas da superdose são sonolência, dificuldades respiratórias, problemas de consciência e ficar inconsciente (coma).

Outros sintomas podem incluir: sensação de confusão, alucinações, agitação, convulsões, visão turva, flacidez muscular incomum, contração súbita dos músculos, reflexos pobres ou ausentes, pressão arterial alta ou baixa, batimento cardíaco lento, rápido ou irregular, diminuição da temperatura corporal, náuseas, vômitos, diarreia ou salivação excessiva.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

M.S. n° 1.0370. 0111

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO n° 2.659

**LABORATÓRIO**

**TEUTO BRASILEIRO S/A.**

---

CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA

CEP 75132-140 – Anápolis – GO

Indústria Brasileira

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA**



## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
18/07/2014	0576781/14-4	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC - 60/12	18/07/2014	0576781/14-4	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC - 60/12	18/07/2014	Versão inicial	VP	10mg com ct bl x 20.
01/12/2015	-	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambialidade	01/12/2015	-	10756 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula para adequação à intercambialidade	01/12/2015	Identificação do Medicamento	VP	10mg com ct bl x 20.