

será necessário durante várias semanas. Operações subsequentes e transplantes podem freqüentemente ser evitadas pela aplicação de **Contractubex**[®]. Ao longo de todo o tratamento de cicatrizes recentes deve evitar-se toda irritação pronunciada como, por exemplo, frio extremo ou luz ultravioleta e também massagens muito fortes.

Superdosagem:

Não são conhecidos casos de superdosagem com o produto.

Atenção: Este produto é um novo medicamento e embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança, quando corretamente indicado, podem ocorrer reações adversas imprevisíveis, ainda não descritas ou conhecidas. Em caso de suspeita de reação adversa o médico responsável deve ser notificado.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.
NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Registro MS - 1.0974.0132
Farm. Resp.: Dr. Dante Alario Junior
CRF-SP nº 5143

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide cartucho/rótulo.

BiOLAB

Fabricado e distribuído sob licença de
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Frankfurt/Alemanha por:
BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda.
Av. Paulo Ayres, 280 - Taboão da Serra - SP
CEP 06767-220 SAC 0800 11 1559
CNPJ 49.475.833/0001-06
Indústria Brasileira

EE 023127 D

 Corte: 240 x 150 mm


CONTRACTUBEX[®]
cepalin[®]
alantoína
heparina sódica



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

• **Forma farmacêutica e apresentação:**

Gel: Bisnaga contendo 20g.

• **USO PEDIÁTRICO OU ADULTO.**

• **Composição:**

Gel

Cada g do gel contém:

cepalin[®] 100,00 mg
alantoína 10,00 mg
heparina sódica 50 UI
Veículo: ácido sórbico, metilparabeno, goma xantana, macrogol, óleo perfumado e água purificada.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

• O **Contractubex**[®] possui efeito antiinflamatório e antiproliferante no tecido cicatricial.

• Mantenha **Contractubex**[®] em temperatura ambiente (15 a 30°C).



- **Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação. Não utilize medicamentos com a validade vencida.

- Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

- Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

- Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A doença e/ou seus sintomas poderão retornar.

- Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

• TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

- Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

- **Contra-indicações:** O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

- **Precauções:** Durante o tratamento de cicatrizes recentes deve-se evitar irritações locais, tais como exposições

ao frio intenso, luz ultravioleta ou massagens muito fortes. (Veja item Precauções nas Informações Técnicas)

• NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Características:** Contractubex® tem a propriedade de alisar e amaciar o tecido endurecido, protuberante, doloroso e cosmeticamente desfigurado das cicatrizes. A heparina sódica estimula a hidratação (capacidade de retenção hídrica) do tecido endurecido, favorece a capacidade da umidificação efetuando, portanto um relaxamento das cicatrizes. O cepalin® (extrato de *Allii cepae* L.) e a alantoína promovem este efeito suavizador. A forma farmacêutica gel promove uma penetração profunda dos princípios ativos e, portanto possibilita um tratamento local intensivo.

- **Indicações:** Cicatrizes hipertróficas e queloidais, limitadoras de movimentos, incômodos após intervenções cirúrgicas, amputações, queimaduras e acidentes; contraturas como as de Dupuytren, contraturas tendinosas traumáticas, retrações cicatriciais.

- **Contra-indicações:** Contractubex® gel não deverá ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.



⚠ **Precauções e Advertências: Gerais**

– Durante o tratamento de cicatrizes recentes deve-se evitar irritações locais, tais como exposições ao frio intenso, luz ultravioleta ou massagens muito fortes.

Gravidez, Lactação ou Pediatria – Não são conhecidas informações que limitem o uso do produto em gestantes, durante a amamentação ou em crianças.

Geriatrics (idosos) – Não há restrições específicas para o uso em pacientes idosos.

🔄 **Interações Medicamentosas:** Não foram reportadas até o momento interações entre o Contractubex® gel e outros medicamentos de uso tópico.

• **Interferência em Exames Laboratoriais:** Não são conhecidos relatos de interferência do Contractubex® no resultado de exames laboratoriais.

☹ **Reações Adversas:** Não foram descritas até o momento reações adversas ao uso deste medicamento.

👤 **Posologia:**

Aplicar o produto várias vezes ao dia com ligeira massagem sobre a pele ou tecido escarificado até completa penetração do gel. Nos casos de cicatrizes antigas ou endurecidas o produto pode ser aplicado utilizando-se uma gaze de proteção durante a noite. De acordo com o tamanho da cicatriz existente ou contratura o tratamento