

MODELO DE BULA (CCDS 0513)

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

DAKTARIN[®] gel oral

miconazol

APRESENTAÇÃO

Gel oral de 20 mg/g de miconazol em bisnaga com 40 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES

COMPOSIÇÃO

Cada grama de gel contém 20 mg de miconazol.

Excipientes: água purificada, álcool etílico, amido pré-gelatinizado, aroma de cacau, aroma de laranja, glicerol, polissorbato 20 e sacarina sódica di-hidratada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

DAKTARIN[®] gel oral é indicado para o tratamento e prevenção da candidíase (um tipo de fungo) da boca (cavidade bucofaríngea).

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

DAKTARIN[®] gel oral tem como princípio ativo o miconazol que age contra fungos causadores de infecções, inibindo uma atividade essencial das células desses fungos e provocando a sua morte.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para uso por pessoas com hipersensibilidade (alergia) ao produto ou portadores de doença do fígado.

Este medicamento é contraindicado em bebês menores de 6 meses de idade ou em bebês em que o reflexo da deglutição (de engolir) não está suficientemente desenvolvido, devido ao risco de bloqueio da respiração (sufocamento).

Não utilize **Daktarin[®] Gel Oral** se você estiver tomando certos medicamentos.

Os efeitos terapêuticos ou colaterais de muitos medicamentos podem ser aumentados ou diminuídos quando tomados com **DAKTARIN[®] gel oral**.

Caso você utilize ou planeje utilizar outro medicamento, informe para seu médico antes de usar **DAKTARIN® gel oral** (veja o item "O que Devo Saber Antes de Usar Este Medicamento? - Interações Medicamentosas").

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Bebês e crianças pequenas:

DAKTARIN® gel oral é viscoso para garantir a sua permanência na boca o maior tempo possível.

Importante: para que o gel não obstrua a garganta da criança e possa provocar sufocamento você deve tomar as seguintes precauções:

- **divida cada aplicação em pequenas porções,**
- **nunca coloque a quantidade total na boca da criança de uma vez,**
- **coloque o gel nas áreas afetadas da boca (áreas brancas) de acordo com o prescrito pelo médico,**
- **nunca coloque grande quantidade de gel na parte posterior, próximo da garganta,**
- **se você estiver amamentando, nunca aplique o gel no mamilo para tratar o bebê.**

Gravidez e Amamentação

Não há estudos adequados e controlados em mulheres grávidas. Em exposições clinicamente relevantes, os estudos em animais não indicam efeitos nocivos diretos ou indiretos relacionados à toxicidade reprodutiva. Como medida de precaução é preferível evitar o uso de **DAKTARIN® gel oral** durante a gestação, a menos que o benefício do tratamento para a paciente ultrapasse os riscos para o feto.

Não se sabe se o miconazol ou seus metabólitos são excretados no leite humano.

Se você estiver grávida ou amamentando, consulte seu médico antes de usar **Daktarin® gel oral**.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações Medicamentosas

Informe seu médico quais medicamentos você está usando. Alguns fármacos não devem ser tomados ao mesmo tempo e, se determinados medicamentos forem tomados ao mesmo tempo, mudanças devem ser feitas (em relação à dose, por exemplo).

Exemplos de medicamentos que nunca devem ser tomados enquanto você estiver usando **DAKTARIN® gel oral** são:

- determinados medicamentos para alergia, como a terfenadina, o astemizol e mizolastina,
- cisaprida, um medicamento usado para problemas digestivos,
- determinados medicamentos que reduzem o colesterol (como a sinvastatina e a lovastatina),
- midazolam (oral) e triazolam, medicamentos tomados para a ansiedade ou para ajudar a dormir (tranquilizantes),
- pimozida e sertindol, medicamentos para certos transtornos psiquiátricos,
- halofantrina, um medicamento antimalárico,
- certos medicamentos utilizados no tratamento da enxaqueca, como alcaloides de ergot,

- certos medicamentos usados para tratar irregularidades do batimento cardíaco, como bepridil, quinidina e dofetilida.

A combinação com outros medicamentos pode requerer monitoramento adicional ou alteração da dose do **DAKTARIN[®] gel oral** ou do outro medicamento. Exemplos são:

- certos medicamentos anticoagulantes (que "afinam" o sangue) como a varfarina,
- certos medicamentos orais para o tratamento de Diabetes como as sulfonilureias,
- certos produtos para AIDS como inibidores da protease do HIV como o saquinavir,
- certos medicamentos usados no tratamento do câncer como alcaloides da vinca, bussulfano e docetaxel,
- alguns medicamentos que atuam no coração e nos vasos sanguíneos (certos bloqueadores de canais de cálcio como as di-hidropiridinas e o verapamil),
- ciclosporina A, tacrolimo e sirolimo (rapamicina), que são medicamentos utilizados após transplantes de órgãos,
- fenitoína, um medicamento utilizado no tratamento da epilepsia,
- certos anestésicos de uso hospitalar como alfentanila,
- sildenafil, um medicamento usado para tratar impotência masculina,
- certos medicamentos para ansiedade (buspirona, alprazolam, midazolam IV) ou que ajudam a dormir (brotizolam) (tranquilizantes),
- certos medicamentos para tuberculose como a rifabutina,
- metilprednisolona, um medicamento para o tratamento de inflamações, administrado por via oral ou injeção,
- trimetrexato, um medicamento usado para tratar um certo tipo de pneumonia,
- ebastina, um medicamento usado para alergia,
- reboxetina, um medicamento usado no tratamento da depressão.
- cilostazol, um medicamento usado para doença vascular periférica e derrame.

Se você estiver tomando algum destes medicamentos ou algum outro produto, converse com seu médico antes de utilizar **DAKTARIN[®] gel oral**. Enquanto estiver fazendo uso de **DAKTARIN[®] gel oral** não comece a tomar outro medicamento sem primeiro informar o seu médico.

Efeitos na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

DAKTARIN[®] gel oral não afeta o estado de alerta ou a capacidade de dirigir.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **DAKTARIN[®] gel oral** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico

DAKTARIN[®] gel oral é branco e homogêneo, com aroma característico de cacau e laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Lave bem as mãos antes de usar **DAKTARIN[®] gel oral**. A aplicação pode ser feita com o auxílio de uma haste flexível recoberta com algodão (Cotonete[®]) ou de uma gaze enrolada no dedo indicador. Deve ser espalhada na parte interna da boca uma quantidade suficiente para cobrir toda a área afetada. O gel não deve ser engolido imediatamente, mas deve ser mantido na boca o maior tempo possível. Assim, o medicamento fica em contato com a boca por um tempo maior.

No caso de adultos que usam dentaduras, elas devem ser retiradas à noite e escovadas com **DAKTARIN[®] gel oral**.

Dosagem

Bebês de 6 a 24 meses: Aplique $\frac{1}{4}$ de colher de chá (1,25 mL) de gel quatro vezes ao dia após uma refeição. Cada dose deve ser dividida em pequenas porções e o gel aplicado sobre a(s) área(s) afetada(s). O gel não deve ser deglutido imediatamente, mas mantido na boca o maior tempo possível.

Adultos e crianças com 2 anos ou mais: Aplique $\frac{1}{2}$ colher de chá (2,5 mL) de gel quatro vezes ao dia após uma refeição. O gel não deve ser deglutido imediatamente, mas mantido na boca o maior tempo possível.

O tratamento deve ser mantido por pelo menos uma semana após o desaparecimento dos sintomas. Alguns pacientes podem necessitar um período mais prolongado de tratamento.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de utilizar o gel oral, aplique a dose assim que você se lembrar. Não aplique o dobro da dose para compensar a dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Se **DAKTARIN[®] gel oral** obstruir a garganta, a respiração de bebês e crianças menores de 6 meses pode ser bloqueada (sufocamento).

As reações adversas ao medicamento relatadas por pacientes adultos tratados com **DAKTARIN[®] gel oral** em quatro estudos clínicos são apresentadas a seguir:

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

Distúrbio do Sistema Nervoso: perda do paladar ou paladar anormal;

Distúrbios Gastrointestinais: boca seca, náusea, desconforto na boca, vômito;

Distúrbios Gerais e Condições no Local da Administração: produto com gosto alterado.

As reações adversas ao medicamento relatadas por pacientes pediátricos tratados com **DAKTARIN[®] gel oral** em um estudo clínico são apresentadas a seguir:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

Distúrbios gastrointestinais: náusea, vômito.

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

Distúrbios gastrointestinais: regurgitação.

Experiência pós-comercialização

Além das reações adversas relatadas em estudos clínicos e mencionadas anteriormente, as reações adversas a seguir foram relatadas durante a experiência após o início da comercialização. As reações adversas são apresentadas por categoria de frequência baseadas em taxas de relatos espontâneos.

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento):

Distúrbios do Sistema Imunológico: reações anafiláticas, angioedema, hipersensibilidade (alergia);

Distúrbios Respiratórios, Torácicos e Mediastinais: bloqueio das vias aéreas;

Distúrbios Gastrointestinais: diarreia, inflamação da boca, descoloração da língua;

Distúrbios hepatobiliares: hepatite;

Distúrbios da Pele e Tecido Subcutâneo: necrólise epidérmica tóxica, Síndrome de Stevens-Johnson, urticária, erupção cutânea, pustulose exantemática generalizada aguda, reação ao medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Sintomas

Se você ingerir uma grande quantidade de **DAKTARIN® gel oral**, você poderá apresentar vômito e diarreia. Entretanto para ter certeza que não há problemas, procure seu médico.

Tratamento

O tratamento é de suporte e não há antídoto específico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS – 1.1236.3402

Farm. Resp.: Marcos R. Pereira - CRF/SP nº 12.304

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.

Rodovia Presidente Dutra, km 154

São José dos Campos – SP

CNPJ: 51.780.468/0002-68

Indústria Brasileira

®Marca Registrada

SAC 0800 7011851

www.janssen.com.br

Venda sob Prescrição Médica

