

# Nenê dent<sup>®</sup> n

Matricaria chamomilla tintura, cloridrato de lidocaína, polidocanol

NYCOMED

Leia com atenção, antes de usar o produto.

**NÃO CONTÉM CONSERVANTES SEM AÇÚCAR**

**Formas farmacêuticas, apresentações e via de administração**

Gel. Bisnagas com 10 g.  
Solução. Frascos com 10 g.  
Uso tópico.

## USO PEDIÁTRICO

### Composição

Cada grama do gel contém:

Cloridrato de lidocaína ..... 3,4 mg  
Polidocanol 600 ..... 3,2 mg  
Tintura de *Matricaria chamomilla* ..... 150,0 mg  
Excipientes q.s.p. .... 1,0 g  
Excipientes: propilenoglicol, xilitol, sorbitol, edetato disódico, carbômer, hidróxido de sódio, polissorbato 20, sacarina sódica, mentol e água purificada.

Cada grama da solução contém:

Cloridrato de lidocaína ..... 3,4 mg  
Polidocanol 600 ..... 3,2 mg  
Tintura de *Matricaria chamomilla* ..... 150,0 mg  
Veículo q.s.p. .... 1,0 g  
Excipientes: glicerol, xilitol, sorbitol, povidona, polissorbato 20, sacarina sódica, mentol e água purificada.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Quando devo usar e qual é a ação esperada de Nenê Dent<sup>®</sup> N?**

Nenê Dent<sup>®</sup> N deve ser usado para aliviar a dor e a coceira, comuns no surgimento da primeira dentição em crianças. Também apresenta ação antiinflamatória local. Sua formulação, desenvolvida especialmente para crianças, não contém conservantes ou açúcar, possuindo o xilitol que previne o desenvolvimento de cáries.

**Como devo guardar Nenê Dent<sup>®</sup> N?**

Você deve guardar o produto na embalagem original, à temperatura ambiente (15°C a 30°C) e proteger da luz.

**Qual é o prazo de validade de Nenê Dent<sup>®</sup> N?**

O prazo de validade está impresso na embalagem do produto. **Após a abertura da embalagem, o prazo de validade do produto é de 1 ano**, desde que dentro do prazo de validade do produto. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

**Posso usar Nenê Dent<sup>®</sup> N durante a gravidez e amamentação?**

Este produto é indicado para crianças com problemas

na dentição. Portanto, considerando indicação específica, restrições e informações quanto a gravidez e lactação não são aplicáveis.

**Existe algum cuidado especial para usar Nenê Dent<sup>®</sup> N?**

Siga as orientações quanto ao uso do produto no item "Posologia e modo de usar". Se ocorrer piora ou persistência dos sintomas, procure orientação médica. Evite o contato do produto com os olhos.

**Posso interromper o tratamento com Nenê Dent<sup>®</sup> N?**

Sim, você pode interromper o tratamento a qualquer momento. Caso o uso do produto esteja sendo feito sob recomendação médica, não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

**Podem ocorrer reações adversas desagradáveis com o uso de Nenê Dent<sup>®</sup> N?**

Reações alérgicas ocasionadas pelos componentes da formulação são possíveis de ocorrer. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Quando o bebê está usando Nenê Dent<sup>®</sup> N, pode-se fazer uso de outras substâncias?**

Não existem relatos de que Nenê Dent<sup>®</sup> N interfira na ação de outros medicamentos. Porém, você deve informar ao médico sobre qualquer medicamento que o bebê esteja usando.

**Quando o bebê não deve usar Nenê Dent<sup>®</sup> N e quando deve utilizá-lo com cuidado?**

O produto não deve ser utilizado em casos de alergia conhecida aos componentes da fórmula. Crianças que apresentem febre ou problemas digestivos durante o processo da primeira dentição devem procurar um médico, pois, estes sintomas não estão necessariamente relacionados ao processo de dentição.

Em casos de vermelhidão ou inchaço da gengiva ou em casos de outras queixas secundárias concomitantes, procure orientação médica.

**Riscos da automedicação: NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### Características

Nenê Dent<sup>®</sup> N, através da ação dos dois anestésicos locais, cloridrato de lidocaína e polidocanol, alivia a dor e a coceira, comuns no surgimento da primeira dentição em crianças.

A tintura de *Matricaria chamomilla* tem ação antiinflamatória local, contribuindo assim para a ação do produto. Sua formulação, desenvolvida especialmente para crianças, não contém conservantes ou açúcar, possuindo o xilitol que previne o desenvolvimento de cáries.

Nenê Dent<sup>®</sup> N pode ser utilizado até a aparição de toda a primeira dentição (dentes de leite) e, posteriormente, quando surgirem os molares.

Segue abaixo ilustração que demonstra o período (referente à idade da criança) em que determinados dentes são formados durante a primeira dentição:

FORMAÇÃO DOS DENTES NA PRIMEIRA DENTIÇÃO	
INCISIVOS	6 a 12 meses
CANINOS	18 a 24 meses
PRIMEIROS MOLARES	12 a 18 meses
SEGUNDOS MOLARES	24 a 30 meses

### Indicações

Para o alívio da dor, prurido e inflamação que surgem durante o processo fisiológico da primeira dentição.

### Contra-indicações

*Hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.*

### Precauções e advertências

*Crianças que apresentem febre ou problemas digestivos durante o processo da primeira dentição devem procurar um médico, pois, estes sintomas não estão necessariamente relacionados ao processo de dentição.*

*Crianças que apresentem casos de vermelhidão ou inchaço da gengiva ou casos de sérias queixas secundárias concomitantes devem procurar um médico.*

*Evitar o contato do produto com os olhos.*

### Interações medicamentosas

*Até o momento, não foram relatados casos de interações medicamentosas com o uso do produto.*


### Reações adversas

*Reações alérgicas ocasionadas pelos componentes da formulação são possíveis de ocorrer.*

### Posologia e modo de usar

**Nenê Dent<sup>®</sup> N Gel:**


1 - Informações para abertura do lacre




Perfurar o lacre da bisnaga com o lado externo da tampa

2 - Aplique uma pequena quantidade de gel, com o auxílio de um dos dedos previamente limpo ou de um chumaço de algodão, sobre a gengiva (local de erupção do dente).

Vide ilustrações abaixo. Deve-se fazer 2 ou 3 aplicações ao dia, preferencialmente após as refeições e antes de dormir ou ainda à critério médico.



**Nenê Dent<sup>®</sup> N Solução:** mantendo o frasco na vertical para gotejar, aplique uma pequena quantidade da solução, com o auxílio de um dos dedos ou de algodão, sobre a gengiva (local de erupção do dente). Vide ilustrações abaixo.



Deve-se fazer 2 ou 3 aplicações ao dia, preferencialmente após as refeições e antes de dormir ou ainda à critério médico.

Nenê Dent<sup>®</sup> N pode ser utilizado até a aparição de toda a primeira dentição (dentes de leite) e, posteriormente, quando surgirem os molares.

### Superdose

Devido às baixas doses dos componentes ativos, até o momento não existem relatos de superdose com manifestações clínicas.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS - 1.0639.0097

Farmacêutico Responsável: Wagner Moi - CRF-SP nº 14.828  
Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

**Dentinol<sup>®</sup>**

Fórmula original de **Dentinol** Gesellschaft fuer Pharmazeutische Praeparate Berlin - Alemanha

**Nycomed Pharma Ltda.**

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5  
Jaguariúna - SP  
CNPJ 60.397.775/0008-40  
Indústria Brasileira

ND00\_0706\_0707  
Cód. Laetus: 235

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE  
**SAC: 0800-7710345**  
www.nycomed.com.br

Cód.: 4031583  
150x210 mm