

# DELTAMETRIL®

deltametrina

Shampoo 0,2 mg/mL

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

## 1 - Nome Genérico:

deltametrina

## 2 - Forma Farmacêutica e Apresentação:

2.1. Shampoo 0,2 mg/mL - frasco de 100 mL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO EXTERNO

## 3 - Composição:

3.1. SHAMPOO - Cada mL contém:

deltametrina.....0,2 mg

Veículo QSP.....1 mL

(lauriletersulfato de sódio, cloreto de sódio, metilparabeno, propilparabeno, álcool etílico, essência de flor do campo e água purificada).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1 - Ação Esperada do Medicamento:

A deltametrina atua como pediculicida e escabicida. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas.

### 2 - Cuidados de Armazenamento:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

### 3 - Prazo de Validade:

Data de fabricação, Vencimento e Nº de lote: vide cartucho

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

**NÃO UTILIZE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ALÉM DE NÃO OBTER O EFEITO DESEJADO, VOCÊ PODERÁ PREJUDICAR SUA SAÚDE. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

### 4 - Gravidez e Lactação:

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após seu término. Informe também se está amamentando. Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso do produto na gravidez ou lactação. Contudo, deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

### 5 - Cuidados de Administração:

Siga sempre as orientações de seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento. A administração conjunta do produto com outros medicamentos só deverá ser realizada após consulta do médico assistente. O uso em crianças e gestantes deve obedecer a cuidados e observações rigorosos. O Deltametril® Shampoo deve ser usado nos cabelos e couro cabeludo. Não usar o produto pra sombrancelhas ou cílios. No caso de contato com os olhos, lavá-los por 15 minutos com água corrente e procurar orientação médica. O produto deverá ser aplicado em local ventilado. Evitar contaminação de alimentos pelo produto. Não reutilizar o recipiente vazio. O tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do seu médico.

Durante o tratamento, o uso de qualquer outro remédio só deverá ser feito com o conhecimento do seu médico.

Evitar o uso do produto sobre regiões lesionadas da pele como nos casos de ferimentos, queimaduras, ulcerações e rachaduras. Evitar que o produto atinja os olhos.

Como normas de higiene, é recomendado:

a - Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas.

b - Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) ou ftíriase (chatos), manter os cabelos curtos e limpos.

c - Evitar exagero no coçar e colocar luvas de proteção nas crianças.

d - Procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles ou seus objetos de uso.

e - Alertar os responsáveis por instituições coletivas frequentadas pelos portadores do parasita.

### 6 - Interrupções do tratamento:

Não interromper o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem riscos, apenas cessará o efeito terapêutico.

### 7 - Reações Adversas:

Em alguns casos, o produtos pode produzir, transitórias na maioria das vezes, algumas reações desagradáveis.



Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.**

#### **8 - Contraindicações:**

O produto é contra-indicado para pacientes que apresentem antecedentes de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Informe a seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

#### **9- Precauções:**

ESTE MEDICAMENTO SOMENTE DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

“NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO; PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE”.

#### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

##### **1 – Características químicas e farmacológicas:**

A deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretroides, substância sintética obtida por esterificação do ácido crisantêmico. A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra piolhos e ácaros. A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas, sendo o *Pediculis humanus capitis*, *Pediculis humanus humanus*, *Phthirus púbis* e seus ovos extraordinariamente sensíveis à sua ação. A sua ação é seletiva e se dá após absorção da substância através do esoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto, a deltametrina transportada pela hemolinfa fixa-se nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do sistema nervoso central, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

##### **2 - Indicações:**

O Deltametril® está indicado no tratamento e profilaxia da PEDICULOSE (piolhos), da FTIRIASE (chatos), da ESCABIOSE (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

##### **3 - Contraindicações:**

HIPERSENSIBILIDADE À DELTAMETRINA, ALERGIA RESPIRATÓRIA E LESÕES DE PELE: FERIDAS E QUEIMADURAS OU CONDIÇÕES QUE POSSIBILITEM MAIOR ABSORÇÃO.

##### **4 – Precauções/Advertências:**

O MEDICAMENTO ESTÁ INDICADO SOMENTE PARA USO TÓPICO. Não deve ser ingerido ou inalado. Deve ser mantido fora do alcance dos olhos e mucosas. No caso de contato acidental com os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente por alguns minutos. No caso de infecção ou irritação da pele, interromper tratamento.

##### **5- Interações Medicamentosas:**

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

##### **6 - Reações Adversas e Efeitos Colaterais:**

Pode ocorrer irritação ocular, cutânea e reações de hipersensibilidade, sobretudo do tipo alergia respiratória. Se o produto for utilizado em pele lesada por feridas ou queimaduras, podem ocorrer maior absorção da deltametrina com efeitos gastrintestinais e neurológicos agudos.

##### **7 - Posologia:**

###### **SHAMPOO:**

Deve ser aplicado nos cabelos e couro cabeludo, de preferência durante o banho, fazendo ligeiras fricções com a ponta dos dedos. Deixar nas áreas atingidas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias consecutivos.

##### **8 - Superdosagem:**

- No caso de ingestão acidental, o tratamento é principalmente de suporte.
- Deve-se induzir o vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica nos inconscientes.
- Pode-se administrar sais catárticos para aumentar o trânsito intestinal e diminuir a absorção de piretrina.
- No caso de inalação acidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

##### **9 - Pacientes idosos:**

Não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

#### **VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

Número do lote, Data de fabricação e Prazo de validade: Vide cartucho

Reg. M.S. nº 1.0917.0047

Farm. Resp.: Dr. Jadir Vieira Junior - CRF - MG nº 10.681

SAC: 0800 0324087

www.medquimica.com

**MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.**

Rua Otacílio Esteves da Silva, 40 - Granjas Betânia

CEP 36.047-400 - Juiz de Fora - MG

CNPJ 17.875.154/0001-20 - Indústria Brasileira



cód. 352-4