

Este medicamento deve ser mantido em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em lugar seco, fresco e ao abrigo da luz.

POSOLOGIA

O medicamento deve ser aplicado três vezes ao dia sobre a área lesada. Pode-se utilizar ou não uma gase estéril oclusiva sobre o local.

ADVERTÊNCIAS

O uso em grandes extensões de queimaduras ou feridas profundas pode originar absorção sistêmica, por isso o risco deve ser avaliado pelo médico. A absorção sistêmica pode ser significativa e originar risco de ototoxicidade ou nefrotoxicidade.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade com maior frequência quando se faz o uso concomitante com outros antibióticos aminoglicosídeos por via sistêmica.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

As reações adversas mais comuns que podem ocorrer são: vermelhidão, "rash" cutâneo, coceira no local e inchaço no local de aplicação.

SUPERDOSE

Deve-se adotar os princípios gerais da conduta no controle de intoxicações exógenas. Adotar medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

ARMAZENAGEM

Este medicamento deve ser guardado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz (evite armazená-lo no banheiro). Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

Reg. no M.S. 1.2568.0196
Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi CRF-PR 5842 R0

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145
Centro Industrial Nilton Arruda Toledo - PR
CNPJ 73.856.593/0001-66
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Centro de Atendimento ao Consumidor
0800 709 9333 / (45) 2103-1166
www.pratidonaduzzi.com.br
cac@pratidonaduzzi.com.br



prati, donaduzzi

sulfato de neomicina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O MEDICAMENTO
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Pomada dermatológica

Bisnaga de 10 g, 15 g, 20 g e 50 g.

USO TÓPICO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

FÓRMULA

Cada g da pomada dermatológica contém:

sulfato de neomicina.....3,5mg

excipiente q.s.p.....1g

Excipientes: petrolato branco, propilenoglicol, álcool cetosteárilico, cetomacrogol 1000, metilparabeno, propilparabeno e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Age de maneira a combater as principais e mais comuns infecções da pele.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Sulfato de neomicina pomada dermatológica está indicado para o tratamento e profilaxia das infecções da pele de qualquer natureza, inclusive traumática ou feridas cirúrgicas.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O sulfato de neomicina pomada dermatológica é contra-indicado em pacientes com histórico de reações de sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento não deve ser aplicado sobre os olhos.

Outros antibióticos aminoglicosídeos podem apresentar reação de sensibilidade cruzada com a neomicina.

Este medicamento não deve ser aplicado sobre queimaduras graves, feridas profundas ou

100

95

75

25

5

0

extensas áreas, exceto sob prescrição médica. Pacientes que possuem sensibilidade conhecida aos componentes da formulação, poderão desenvolver reação do tipo alérgica, portanto, não devem utilizar este medicamento.

“Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.”

“Informe ao médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.”

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? ■■■

Sulfato de neomicina pomada dermatológica é de uso tópico, com aspecto homogêneo, cor branca e odor característico.

Primeiramente lavar a região afetada com água e sabão apropriado e secar cuidadosamente o local.

Aplicar três vezes ao dia sobre a área lesada. Pode-se cobrir ou não com gase estéril a região onde foi aplicada a pomada.

“Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.”

“Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento”.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? ■■■■

As reações desagradáveis mais comuns que podem ocorrer são: vermelhidão, “rash” cutâneo, coceira no local e inchaço no local de aplicação, irritação local que não existia antes do uso do produto e ainda diminuição na audição.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTA MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ? ■■■■■

Deve-se adotar os procedimentos gerais da conduta no controle de intoxicações exógenas. Adotar medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? ■■■■■■

Este medicamento deve ser armazenado em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), em local seco, fresco e ao

abrigo da luz (evite armazená-lo no banheiro). Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ■■■■■■■■

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS ■■■■■■■■■■

A neomicina é um antibiótico de amplo espectro, um dos mais importantes antibióticos para uso tópico conhecido e seu mecanismo de ação se baseia na interferência da síntese protéica do microrganismo. Este medicamento pertence a família dos aminoglicosídeos, que é particularmente eficaz contra germes gram-negativos e, também, contra alguns germes gram-positivos como os estafilococos.

Ainda tem-se que este antibiótico não é absorvido pela pele intacta, porém, quando aplicado em queimaduras de grande extensão ou feridas profundas, é facilmente absorvido.

INDICAÇÕES ■■■■■■■■■■■■

Tratamento e profilaxia das infecções da pele de qualquer natureza, inclusive feridas traumáticas ou cirúrgicas.

Deste modo, também é indicada para o tratamento de infecções da pele causadas por microrganismos sensíveis ao antibiótico como: eczemas infectados, piodermites, furúnculos, abscessos e úlceras cutâneas.

CONTRA-INDICAÇÕES ■■■■■■■■■■■■■■

O sulfato de neomicina é contra-indicado em pacientes com histórico de reações de sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula e não está indicado para uso oftálmico.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO ■■■■■■■■■■■■■■■■

O sulfato de neomicina pomada dermatológica deve ser aplicado sobre a área lesada. Antes de aplicar o medicamento, deve-se lavar o local com água e sabão apropriado e secar bem. Pode-se utilizar ou não uma gase estéril oclusiva sobre o local.