

# QUEIMALIVE

sulfacetamida sódica - DCB: 08108  
trolamina - DCB: 08961

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**Nome comercial:** QUEIMALIVE

**Nome genérico:** sulfacetamida sódica (DCB 08108) + trolamina (DCB 08961)

## APRESENTAÇÕES

Pomada dermatológica – 74mg/g + 20mg/g - Embalagem contendo 1 bisnaga de 30 g.

## USO TÓPICO

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

## COMPOSIÇÃO

Cada grama de QUEIMALIVE pomada contém:

sulfacetamida sódica (equivalente a 50mg de sulfanilamida).....74 mg  
trolamina ..... 20 mg  
Excipientes q.s.p. .... 1 g  
(petrolato branco, lanolina anidra, petrolato líquido e água purificada).

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

QUEIMALIVE é indicado para o tratamento de queimaduras solares e domésticas, abscessos, piodermites, ferimentos e outras lesões dérmicas.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

QUEIMALIVE combina ações preventivas e curativas de infecções, estimula a cicatrização e, ainda, proporciona o alívio dos

sintomas causados pelas queimaduras, abscessos, piodermites, ferimentos e outras lesões dérmicas.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso de QUEIMALIVE é contraindicado em pacientes com história de alergia às outras sulfas ou a qualquer um dos componentes da formulação e em lactentes.

O uso de medicamentos contendo sulfacetamídicos não é recomendado durante a gravidez, bem como durante a amamentação.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Não há contraindicações relativas a faixas etárias.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Muita atenção durante o uso em áreas raspadas ou em feridas abertas. É recomendada cautela a pacientes com histórico de asma e alergias, e a idosos, que são mais suscetíveis a reações.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

QUEIMALIVE deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz e da umidade.

QUEIMALIVE possui prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabricação desde que observados os cuidados com o armazenamento.



4000855190

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança mantenha o medicamento na embalagem original.**

QUEIMALIVE é uma pomada amarelada, untuosa ao tato, isenta de material estranho e odor característico. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Após assepsia da lesão, aplique uma camada fina de pomada, ou utilize conforme critério médico.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

### 7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Informe ao seu médico o aparecimento de quaisquer reações desagradáveis, tais como: vermelhidão, prurido, edema, urticária, erupções e outros sinais de hipersensibilidade cutânea. Caso ocorra qualquer uma destas reações, o uso do produto deve ser imediatamente suspenso e o médico informado.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o**

aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. **Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através da Central de Atendimento ao Consumidor (CAC).**

### 8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não foram relatados casos de superdosagem com o uso tópico de sulfacetamida.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

## III - DIZERES LEGAIS

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122  
Reg MS 1.1560.0081

**CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.**

Rod. BR 153 Km 5,5 – Jardim Guanabara

CEP: 74675-090 – Goiânia / GO

CNPJ: 17.562.075/0001-69

Indústria Brasileira

