

## Texto de Bula para o Paciente - Vertigoheel® Comprimido

Vertigoheel®

Anamirta cocculus D4 + ASSOCIAÇÃO

**Medicamento Antihomotóxico.**

### APRESENTAÇÃO

Comprimidos sublinguais de 301,5 mg – Frasco com 50 comprimidos.

### VIA ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém: 210 mg de Anamirta cocculus D4 trit.; 30 mg de Conium maculatum D3 trit.; 30 mg de Ambra grisea D6 trit.; e 30 mg de Petroleum rectificatum D8 trit.. Excipientes: estearato de magnésio e lactose q.s.p..

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Vertigoheel é indicado para vertigens e tonturas de várias origens.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

#### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A aplicação do medicamento antihomotóxico atende aos princípios da Homotoxicologia. Esta terapêutica considera as enfermidades como a expressão de uma resposta defensiva do organismo contra as homotoxinas endógenas e as exógenas, ou o resultado de danos tóxicos que o organismo tenta compensar, com a finalidade de restabelecer dentro do possível o equilíbrio biológico. Este novo conceito de tratamento nasceu na terapêutica homeopática, a qual está embasada no princípio da similitude, na lei de cura e na patogenia das substâncias medicamentosas descritas nas Matérias Médicas Homeopáticas, bem como, nos conceitos da imunologia.

#### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contra-indicado às pessoas com alergia à lactose e aos outros componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Durante a lactação não use este medicamento sem orientação do seu médico.**

#### O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento contém LACTOSE. Se você tem intolerância à lactose suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico. A intolerância a lactose pode provocar problemas gastrintestinais, ou ainda, um efeito laxante.

**Informe seu médico ou cirurgião-dentista sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve guardar este medicamento, sempre na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), longe de qualquer tipo de fonte de calor e, ou umidade.

O comprimido de Vertigoheel é branco, redondo, com superfícies planas, sem odor e de sabor levemente adocicado.

Este medicamento tem validade de 36 meses.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

## Texto de Bula para o Paciente - Vertigoheel® Comprimido

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se você poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é de uso oral. Você deve colocar o comprimido embaixo da língua para ser dissolvido.

**Dose recomendada para uso adulto:** 1 comprimido sublingual, 3 vezes ao dia. Nos casos agudos, tomar 1 comprimido a cada 30 minutos, ou de 1 em 1 hora, porém, no máximo 12 comprimidos por dia. Após a avaliação médica a dosagem poderá ser modificada e dependendo da necessidade, poderá ser aumentada para 3 comprimidos 3 vezes ao dia.

**Dose recomendada para uso pediátrico:** conforme tabela abaixo:

Idade	Dosagem normal	Dosagem para sintomas agudos
4-6 anos	½ comprimido 3 vezes ao dia	½ comprimido 6 vezes ao dia
7-11 anos	1 comprimido 2 vezes ao dia	½ comprimido 8 vezes ao dia

Mantenha o frasco sempre fechado após o uso.

Mantenha sempre a dose e a frequência indicadas pelo prescritor.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Caso os sintomas persistam por mais de 2 dias ou se agravem, suspenda o uso do medicamento e entre em contato com o seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião dentista o aparecimento de sintomas novos, agravamento de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos, pois pode significar uma reação ao medicamento, que pode requerer uma nova orientação do prescritor.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

### O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça-se de tomar o medicamento, não duplique a quantidade de medicamento na próxima tomada.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

### QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu médico, ou farmacêutico.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).

### O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A conduta nos casos de ingestão acidental e, ou ingestão acima da dose sugerida, ou prescrita, é observar o surgimento de alguma manifestação clínica, tais como: tontura, enjôo, náuseas e dor de cabeça e, caso isto aconteça, suspenda o uso do medicamento e procure o seu médico, ou o farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

## Texto de Bula para o Paciente - Vertigoheel® Comprimido

### **Venda sob prescrição médica.**

Lote, data de validade e data de fabricação: vide frasco e cartucho.

MS: 1.6198.0001.002-1

Farmacêutico responsável: Wilton Adão CRF-SP nº 46.806

Fabricado por: Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 – Baden-Baden, Alemanha.

Importado e distribuído por:

### **Heel do Brasil Biomédica Ltda.**

Alameda Tocantins, 630 – G8 – Alphaville

06455-020 – Barueri – SP

CNPJ: 05.994.539/0001-27

SAC: 0800-7709000

[www.heel.com.br](http://www.heel.com.br)

**- Heel**

