

Mitburn 50mg 60 Cápsulas

Descrição:

Mitburn é um ativo cuja matéria-prima é oriunda das oliveiras orgânicas, da região de Provence, na França. Eleito melhor emagrecedor natural do mundo em 2019.

É o primeiro ingrediente nutracêutico natural que combina propriedades potentes de queima de gordura ligadas a uma via bioquímica inovadora. Atua no controle do peso através do estímulo da atividade e biogênese mitocondrial.

Mitburn ainda atua no controle da glicemia e resistência insulínica, bem como apresenta potente atividade antioxidante.

Como age? Mitburn estimula a biogênese mitocondrial a partir de uma via inovadora: o receptor TGR5. TGR5 regula os genes envolvidos na oxidação de ácidos graxos e termogênese. A ativação do TGR5 é um fator importante na queima de adipócitos. Mitburn ativa TGR5 e aumenta a UCP1 que está associada à termogênese.

Regula os genes envolvidos na oxidação de ácidos graxos e atua sobre os adipócitos brancos transformando-os em marrons (capaz de dissipar energia como calor por termogênese) e os marrons são ricos em mitocôndrias. Com o aumento na formação de novas mitocôndrias, o excesso de tecido adiposo que se acumula na circunferência abdominal diminui. Mitburn contribui assim para a lipólise, aumento do número mitocondrial, faz beta-oxidação que ocorre no DNA mitocondrial, termogênese e conversão de lipídeos.

Atua na melhora do metabolismo energético reduzindo a quantidade de gordura corporal. A ingestão contínua aumenta a eficiência na queima de gordura. Aumenta a expressão de TGR5 nos tecidos da pele humana, incluindo a gordura subcutânea. Atua no sobrepeso e na obesidade. A beta-oxidação acelera a queima de gordura e Mitburn atua especialmente nas regiões de maior acúmulo de gordura como flancos, abdômen e quadris.

Os resultados são aumento da energia e vitalidade e uma forma física melhor.

Estudos demonstraram que Mitburn demonstrou ser eficaz em apenas 21 dias de uso, no qual os voluntários eliminaram em média 15 cm de circunferência abdominal e ao longo do estudo (90 dias) a média de perda de peso foi de 10,5 Kg por voluntário.

Venda sob prescrição de profissional habilitado, podendo este ser o nosso farmacêutico de acordo com a Resolução 586/2013 do Conselho de Farmácia. Consulte-o!

Composição:

Mitburn 50mg

Excipiente qsp 1 cápsula

Modo de Usar:

Ingerir 1 cápsula após o café da manhã ou antes do treino.

Indicações:

REDUÇÃO DE 15 CM DE BARRIGA EM APENAS 21 DIAS DE USO.

- Redução do peso corporal
- Booster energético para atividades físicas
- Booster para cetose (Dietas Keto plant based e cetogênica)
- Estímulo a beta-oxidação
- Diminuição da circunferência abdominal, flancos e quadris.
- Aumento da vitalidade e energia
- Regulação do metabolismo de carboidratos
- Aumento da energia e vitalidade
- Modulador epigenético
- Estimula a atividade da telomerase
- Previne o envelhecimento
- Transformação de adipócitos brancos em marrons
- Aumento da termogênese
- Regulação do metabolismo de lipídios
- Redução da adiposidade visceral e hepática
- Aumento da atividade mitocondrial
- Aumento da biogênese mitocondrial

Modo de Usar:

Tomar 1 cápsula após o café da manhã ou antes do treino.

Validade:

4 meses

Advertências:

1. Nunca compre medicamento sem orientação de um profissional habilitado.
2. Imagens meramente ilustrativas.
3. É necessário uma dieta e exercícios físicos para auxiliar a redução de peso.
4. Pessoas com hipersensibilidade à substância não devem ingerir o produto.
5. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico.
6. Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Qualquer dúvida entre em contato com a Droga Líder Manipulação.
7. Manter em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.
8. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

9. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.
10. Este medicamento não deve ser utilizado por menores de 18 anos sem orientação médica.
11. Este medicamento não deverá ser partido ou mastigado.
12. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.
13. Este medicamento não deve ser utilizado durante o período de amamentação sem orientação médica.
14. "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO".

Referências:

1. Informações do fornecedor Biodiversite Mitburn.