

OptoCare

UL

ALTA PERFORMANCE

COMPOSIÇÃO

Propilenoglicol, polietilenoglicol 400, sorbitol, carmelose sódica, ácido bórico, cloreto de potássio, cloreto de sódio, edetato dissódico di-hidratado, aminometilpropanol e água purificada.

Pode conter hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH.

INDICAÇÕES

O produto OPTOCARE UL é indicado para lubrificação e hidratação ocular.

OPTOCARE UL é usado para alívio de ardência, irritação, ressecamento, desconforto, ardor, sensação de areia e corpo estranho, que podem ser provocados por fatores ambientais como poeira, fumaça, raios ultravioleta, calor seco (sauna), ar condicionado, vento, cosméticos, exposição prolongada a computadores e/ou aparelhos de televisão.

MODO DE USO

Aplicar 1 a 2 gotas no(s) olho(s) afetado(s) sempre que necessário. Para proceder a aplicação, puxar delicadamente a pálpebra inferior para baixo até formar uma pequena bolsa.

CONTRAINDICAÇÕES

OPTOCARE UL é contraindicado para pacientes que apresentem alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Exclusivamente para uso externo.
- Seguir rigorosamente as instruções de seu médico especialista e as instruções de uso do produto.
- Não utilize o produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Não utilize se houver alteração da cor do produto ou se este se tornar turvo.
- Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em nenhuma superfície.
- Tampar após o uso.
- Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.
- Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
- Respeitar a data de validade marcada no produto.

- Descartar o restante da solução, em caso de sobra, após 4 meses da abertura do frasco.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Em caso de ingestão, consultar um médico.
- Interromper o uso e consultar um médico em caso de aparecimento de reações indesejáveis.

EVENTOS ADVERSOS

Não há relatos de reações adversas com o uso de OPTOCARE UL.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses após data de fabricação.

PRODUTO ESTÉRIL (por calor)

NÃO USAR SE A EMBALAGEM ESTIVER ROMPIDA OU DESTAMPADA

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial
Porto Alegre | RS | CEP 91790-005 | Brasil

Fone: +55 51 3250.8256

CNPJ: 87.375.952/0001-78

Resp. Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt | CRF/RS: 14228

Registro ANVISA/MS: 80256510008

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Distribuição e Comercialização:

KLEY HERTZ FARMACÊUTICA S.A.

Rua Comendador Azevedo, 224 | Bairro Floresta

Porto Alegre | RS | CEP 90220-150 | Brasil

CNPJ: 92.695.691/0001-03

INDÚSTRIA BRASILEIRA

www.kleyhertz.com.br

SAC: 0800 7049001